

ISSEMENTS AGRIC

MIDI-PYRENEES

EDITION GRANDES CULTURES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33

Abonnements: 61.24,70.30

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES" CCP: 8618-62 Y Toulouse

I.S.S.N.: 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL 200 F.

BULLETIN N° 6 DU 9 AVRIL 1992

COLZA

Stades végétatifs

Floraison en cours dans la majorité des parcelles de la région, soit F1 (ouverture des premières fleurs à F2 (nombreuses fleurs ouvertes).

RAVAGEURS

Situation

A signaler le début des captures de charançons des siliques depuis les premiers jours d'Avrii.

Préconisation

Rest encore trop tôt pour intervenir. Attendre le stade G2 à G3 (apparition des dix premières siliques).

Seuil d'intervention : présence en moyenne d'un charançon pour deux plantes.

Produits utilisables:

- alphaméthrine	FASTAC	à 0,2 l de p.c.
- bifenthrine	TALSTAR	à 0,1 l de p.c.
- cyfluthrine	BAYTHROID	à 0,2 l de p.c.
- cyperméthrine	CYMBUSH, KAFIL SUPER	à 0,25 l de p.c.
	nombreuses spécialités	à 20 g de m.a.
- deltaméthrine	DECIS	à 0,2 l de p.c.
- dialiphos	TORAK	à 1,25 l de p.c.
- endosulfan	nombreuses spécialités	à 600 g de m.a.
- esfenvalérate	SUMI ALPHA	à 0,6 l de p.c.
- fenvalérate	SUMICIDIN 10	à 0,4 l de p.c.
- lambda-cyhalothrine	KARATE	à 0,1 l de p.c.
- phosalone	ZOLONE FLO, AZOFENE FLO	à 2,5 l de p.c.
	nombreuses spécialités	à 1 200 g de m.a.
- tralométhrine	TRACKER 108 EC	à 0,065 l de p.c.

MALADIES

Situation

Le sclérotinia et l'alternaria sont les deux maladies les plus à craindre dans notre région.

Le sclérotinia sera déterminé par la pluviométrie des 40 jours à venir.

L'alternaria est à craindre si sa présence est détectée sur les feuilles supérieures, ce qui n'est pas le cas actuellement.

<u>Préconisation</u>

Le traitement contre le sclérotinia est préventif et à positionner à la chute des premiers pétales, à défaut limite passage du tracteur. Les spécialités à base d'imide (CALIDAN, KONKER et SUMISCLEX) assurent la protection la plus longue contre cette maladie (4 semaines environ).

Remarque:

A signaler deux erreurs d'impression dans le tableau des produits de la Fiche "Maladies du Colza au printemps":

- les IMPACT (R, RM et yellow) devraient être classés en vert foncé (et non en vert clair) sur Pseudocercosporella;
- l'HORIZON à 1 l est autorisé sur alternaria et devrait figurer en vert clair.